

- پر و کرک پرنده‌گان و تماس با حیوانات (به خصوص پوست، مو و فضولات آنها) - سوسک حمام و سایر حشرات خانگی - سرمای شدید یا تغییر دمای ناگهانی و شدید - خشکی هوا - رطوبت شدید و فضاهایی با بخار آب اشبع (مثل سوتا و چشم‌های آب گرم) - ابتلا به بیماری‌های عفونی و ویروسی (مثل سرماخوردگی و آنفلوآنزا) - استرس، اضطراب و فشارهای روانی - فعالیت جسمانی سنگین و ورزش (به خصوص در هوای سرد یا آلوده)



در صورت بروز هر یک از علایم زیر مجدداً به اورژانس یا پزشک مراجعه کنید:

- تشدید دوباره‌ی علایم و بروز حمله به شکل قبل با وجود مصرف داروها
- نیاز به استفاده‌ی مکرر از اسپری‌های سبز یا آبی با فاصله‌ی کمتر از 2-3 ساعت یا در طول شب

- بروز تنگی نفس شدید یا عدم توانایی در نفس کشیدن و احساس قطع تنفس

- درد یا سنگینی قفسه‌ی سینه که با استراحت و استفاده از اسپری‌ها (آبی و سبز) بهتر نشود - تند شدن و کوتاه شدن نفس‌ها یا تنفس سطحی و صدادار - سرفه‌های طولانی، پیوسته و شدید پشت سر هم - سرفه همراه با خروج خلط زیاد و غلیظ (زرد یا سبز یا قهوه‌ای) با خروج خلط خونی - بریده بریده و به سختی صحبت کردن یا عدم توانایی در تکم - گرفتگی و سفت شدن عضلات گردن هنگام تنفس - سفت شدن یا به داخل کشیده شدن عضلات قفسه‌ی سینه و فرو رفتن (به داخل کشیده شدن) فضاهای بین دندنه‌ها هنگام تنفس - سردد یا سرگیجه یا سیکی سر و سیاهی رفتن چشم‌ها - رنگ پریدگی یا تعریق شدید - سیاه شدن و کبوتد لب‌ها - کبوتد یا رنگ پریدگی انتهای انگشتان و ناخن‌ها - اختلال و سختی بلع یا بیرون ریختن براق (آب دهان)، از دهان - تورم زبان، حلق، گلو و لب‌ها یا تورم اطراف چشم، صورت، دست‌ها و پاها - تب و لرز - تهوع و استفراغ - ضعف و بی حالی یا خواب آلودگی شدید یا کاهش سطح هوشیاری و بیهوشی - بروز ضایعات پوستی گسترده و خارش دار (کهیر) به هم پوسته، دردناک و متورم

در صورت بروز دوباره‌ی حمله‌ی آسم به شکل زیر عمل کنید:

- آرام باشید و خونسردی خود را حفظ کنید. - از حرکات سریع و شدید مثل دویدن و یا خروج ناگهانی به سمت فضای باز به خصوص در صورت سرد و خشک بودن هوای بیرون خودداری کنید. - بر روی یک صندلی بشینید و پشت خود را کاملاً صاف نگاه دارید. به هیچ وجه تنها نمانید، کمک بخواهید، یک نفر باید در کنار شما باشد. همراه شما باید سریعاً با مرکز اورژانس (آمبولانس) تماس بگیرد (تلفن 115). - سعی کنید آرام و عمیق نفس یکشید - از اسپری آبی رنگ 4 پاف پشت سر هم استفاده کنید. - نفس عمیق یکشید و 4 دقیقه صبر کنید

بیمار گرامی خانم / آقای شما دچار حمله‌ی حاد آسم شده و به علت ابتلا به سرفه □ تنگی نفس □ گرفتگی قفسه‌ی سینه □ سایر علایم □ به اورژانس مراجعت کرده اید، با توجه به علایم شما، معاینات و بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد علل خطرناک و عوارض مهمی که نیاز به بستری در بیمارستان دارد فعلای وجود نداشته و در حال حاضر با توجه به بهبود وضعیت تنفسی و رفع علایم می‌توانید به منزل بازگردید.

آسم یک بیماری تنفسی غیرعفونی و غیر واگیر است که در آن راه‌های هوایی که مسیر عبور هوای (پس از بینی و حلق و نای) به سمت ریه‌ها هستند تنگ و باریک شده و هوای کافی به خوبی و آسانی به ریه‌ها و داخل بدن نمی‌رسد و باعث بروز علایم زیر می‌شود:

(سرفه - تنگی نفس و سختی تنفس - گرفتگی و سنگینی قفسه‌ی سینه) - خس خس سینه و تنفس صدادار

اما شدت علایم همیشه ثابت نبوده و به شکل دوره‌ای با فاصله‌ی زمانی متفاوت بروز می‌کند

طول مدت باقی ماندن علایم بیماری متفاوت بوده و از چند دقیقه یا ساعت تا چند روز متغیر است اما اغلب در طول 1-2 روز بهبود می‌یابد، هرچند معمولاً نمی‌توان علت دقیق بیماری را مشخص کرد اما عوامل زیر در بسیاری از افراد ممکن است باعث بروز علایم و حتی ایجاد حمله‌ی شدید آسم شوند

- گرد و خاک و غبار (مثل گرد و غبار اسیاب منزل و مبلمان) - گل‌ها و گیاهان (به خصوص گرده‌ی گل‌ها) - آلدگی هو و دوده و ذرات ریز معلق در هوا

- برخی غذاها (به خصوص گوجه فرنگی، هندوانه، ادویه‌ها، فلفل قرمز، زعفران، سس‌ها، غذاهای شور، آجیل‌هایی مثل بادام زمینی و گردو، غذاهای دریابی، کسره‌ها مثل ماهی تن، غذاهای آماده و بسته بندی، غذاهای دارای ترکیبات نگهدارنده یا رنگ‌های مصنوعی، انواع شکلات و شیرینی، نوشابه‌ها)

- داروهای مختلف (آسپرین، بعضی از داروهای ضد درد مثل بروفن و ناپروکسین، برخی از داروهای ضد فشار خون مثل آتسنول و پروپرانولول)

- انواع عطرها و اسانس‌ها یا مواد آرایشی و بهداشتی معطر

- انواع ترکیبات به شکل افسانه و اسپری (مثل خوشبو کننده‌ی هوا، حشره‌کش، پاک‌کننده‌ها، شیشه‌پاک‌کن، اسپری‌های ویژه‌ی آرایش مو)

- اسیدها، مواد شیمیایی و نفتی یا شوینده‌ها با بوی تند و سوزاننده (مثل مایع سفید کننده، جوهر نمک، مایع لوله بازن، گازوبیل، بنزین و تینر)

- انواع دود (مثل دود سیگار و تنباکو، دود هیزم و چوب و زغال، دود اگزوز اتومبیل، دود اجاق های غذاپزی با شعله‌ی زیاد)

- انواع کپک و مواد فاسد - پارچه‌های پشمی و پر زدار



دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی رازی ایلام

آموزش بدو پذیرش، حین پذیرش و پس از ترخیص



حمله‌ی آسم

(Asthma Attack)

واحد آموزش همگانی

واحد آموزش به بیمار

تنظیم: واحد آموزش

منبع: دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس معاونت درمان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

25. از مصرف هرگونه مواد بهداشتی، آرایشی، شوینده و انواع عطر و اسپری با مارک ها و اسامی جدید یا ناشناخته جدا خودداری کنید، به طور کلی مصرف این مواد را تا حد امکان کاملاً کاهش دهید از مواد غیرضروری مانند رنگ یا اسپری های آرایش مو، عطرهای تند و ترکیبات پاک کننده‌ی صورت استفاده نکنید. 26. از استعمال سیگار و قلیان و نیز حضور در مکان هایی که دود آن وجود دارد (مثل قهوه خانه ها) جدا خودداری نمایید.

27. از تماس با هرگونه دود (مثل دود هیزم و چوب یا دود اگزوز ماشین ها) دوری کنید.

28. از شنا کردن در استخرهای عمومی خودداری کنید.

29. در ساعت شلوغ و آلوده‌ی روز (مثل ساعت 10-14) از حضور (بويژه پياده) در مناطق مرکزی و شلوغ و پرترافیک شهری کاملاً خودداری کنید.

30. تا حد امکان از حضور در پمپ های بنzin و پياده شدن از ماشین در اين محل ها پرهیز کنید.

31. در فصل های شلوغ از مسافت به مناطق پرتراکم و آلوده و غبارآلود خودداری کنید.

32. هنگام حضور در هوای سرد دهان و بینی خود را کاملاً با يك پارچه یا شال ضخیم بپوشانید.

33. از انجام فعالیت های سنگین جسمانی و خستگی شدید بويژه در هوای سرد و خشک خودداری کرده و استراحة کافی داشته باشید.

34. از حضور در مکان های کاملاً مرتبط و بدون تهویه یا تماس با رطوبت گرم (مثل سونا و چشممه های آب گرم) پرهیز کرده و در صورتی که هوای منزل شما شدیداً خشک است از دستگاه های بخارساز سرد استفاده کنید.

35. اصول بهداشتی و پیش گیری از بروز بیماری های عفونی را کاملاً رعایت کنید تا دچار سرماخوردگی و آنفلوانزا نشوید، ابتلا به این بیماری ها باعث بدتر شدن علامت آسم می شوند، بهتر است سالانه با مشورت پزشک خود واکسن آنفلوانزا را تزریق کنید.

36. از عوامل ایجاد اضطراب، استرس و فشارهای عصی، هیجانات عاطفی، واکنش های شدید احساسی، بحث و مجادله تا حد امکان دوری کنید.

7 افراد خانواده و نیز دوستان و همکاران نزدیک خود را از وضعیت بیماریتان آگاه کنید و به آنها کاملاً آموزش دهید در صورت بروز حمله‌ی تنفسی چگونه به شما کمک کنند.

38. بر روی يك کارت یا کاغذ با خط خوانا ابتلا خود به بیماری آسم را نوشته و هنگام خروج از منزل آن را در کیف یا جیب خود در محلی که به راحتی قابل دسترسی باشد قرار دهید.

10- به هیچ وجه بدون همراه داشتن اسپری های آبی یا سبز از منزل خارج نشود، توصیه می شود چند عدد از این نوع اسپری را تهیه کرده و در مکان های مختلف مثل کیف دستی، ساک ورزشی، داشبورد اتومبیل و داخل میز کار خود قرار دهید.

11- در صورتی که هنگام ورزش و فعالیت دچار بروز علائم می شود می توانید 15 دقیقه قبل از شروع ورزش از اسپری آبی استفاده کنید، هم چنین پیش از آغاز ورزش بدن خود را گرم و آماده سازی کرده و به آرامی شدت فعالیت را زیاد کنید و از ورزش کردن در هوای سرد خودداری نمایید.

12- از مصرف غذاهای تحریک کننده که در بالا به نام بعضی از آنها اشاره شد تا حد امکان خودداری نمایید.

13- تماس خود با گل ها و گیاهان (مثلاً حضور در باغ یا پارک یا گل فروشی) را تا حد امکان محدود کرده و از نگهداری آنها در داخل منزل بويژه اتاق خواب خودداری کنید.

14- از صابون ها یا مواد شوینده‌ی معطر برای استحمام و شستن لباس ها استفاده نکنید و از تماس طولانی مدت با مواد شوینده‌ی دارای بوی تند خودداری نمایید.

15- از تماس نزدیک با حیوانات، پرندگان و فضولات آنها اجتناب کرده و از ورود آنها به داخل منزل و اتاق خواب خود جلوگیری کنید.

16- نظافت منزل را کاملاً رعایت کرده، از تجمع گرد و غبار بر روی وسایل جلوگیری کنید و کلیه‌ی وسایل را هر 2-3 روز یک بار کاملاً تمیز و گردگیری نمایید.

17- هنگام نظافت منزل دهان و بینی خود را با ماسک یا پارچه‌ی مرطوب بپوشانید و از حداقل میزان مواد شیمیایی مثل شیشه‌ی پاک کن یا پاک کننده‌ی سطوح استفاده کنید.

18- پس از استفاده از انواع مواد شوینده و شیمیایی پنجره ها را برای مدتی باز نگاه دارید.

19- فرش و موکت ها را هر 4-7 روز یک بار به خوبی و با قدرت جارو بزنید و زیر فرش ها را کاملاً تمیز کنید، تا حد امکان از جاروبرقی استفاده نمایید.

20- از انداختن فرش (به خصوص غیر دستباف) در اتاق خواب خود خودداری کنید.

21- هنگام خوابیدن از ملحفه های کاملاً نخی و بالش پنبه‌ای استفاده کرده و هر 7 روز یک بار آنها را با آب گرم بشویید، هنگام شستشو از مایع سفید کننده‌ی غلیظ یا نرم کننده های معطر استفاده نکرده و آنها را در هوای آزاد خشک کنید.

22- از ایجاد کپک بر روی سطوح مختلف منزل (مثل کناره‌ی شیرهای حمام) یا مواد غذایی فاسد شونده جلوگیری کرده و محل های مناسب رشد کپک (مثل کهنه ها و اسفنج های آشپزخانه، داخل ماشین لباسشویی و نفاط نمناک) را شناسایی و پاکسازی کنید.

23- در صورت وجود تعداد زیادی سوسک حمام در منزل شما باید جهت نابودسازی کامل آنها و سم پاشی مناسب منزل اقدام کنید.

پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیه های زیر توجه کنید:

1- علت دقیق بروز حمله معمولاً به سختی مشخص می شود، در صورتی که دقیقاً علت بروز حمله‌ی فعلی را نمی دانید و سابقه‌ی حساسیت شناخته شده ای ندارید، عامل ایجاد آن احتمالاً ماده‌ی کاملاً جدیدی است که در چند روز اخیر به تازگی با آن تماس داشته باز آن استفاده کرده اید (انواع غذاها، داروها، مواد شیمیایی مختلط، عطر، لباس و....)، بنابراین با مرکز کامل فهرستی از فعالیت های اخیر خود مانند تماس با مواد مختلف، غذاهای مصرف شده (شامل کلیه‌ی مواد اولیه) و حضور در مکان های مختلف را یادداشت نمایید تا به یافتن عامل حساسیت را کم کند

2- در صورتی که هنگام ترخیص داروی خاصی (مثل کورتون خوارکی) برای شما تجویز شده است فقط همان دارو را طبق دستور و تا زمان معین شده مصرف کنید.

3- درمان آسم در اغلب موارد نیاز به مصرف آنتی بیوتیک ندارد، بنابراین از مصرف خودسرانه‌ی این داروها جدا خودداری کنید، اما در صورت تجویز حتماً دارو را در زمان مشخص مصرف کرده و دوره‌ی درمان را تا انتهایها کامل نمایید.

4- از مصرف ترکیبات مختلف تزریقی یا خوارکی کورتون دار (مثل دگزاماتازون، بتاماتازون، هیدروکورتیزون، پردنیزولون) به طور خودسرانه و بدون دستور پزشک کاملاً خودداری کنید و در صورتی که هنگام ترخیص برای شما از این گروه دارویی تجویز شده است تنها طبق دستور مصرف کرده و حتماً در زمان مشخص شده دارو را قطع کنید.

5- از ترکیبات گیاهی ناشناخته به عنوان دارو استفاده نکنید.

6- در صورتی که برای بیماری خاصی داروهای دیگری را به طور دائم مصرف می کنید (مثل انواع کورتون یا داروهای ضد تشنج یا وارفارین) حتماً به پزشک خود اطلاع دهید، اما به هیچ وجه به طور خودسرانه مصرف دارو را تغییر نداده با قطعه نکنید.

7- از مصرف خودسرانه ای انواع داروهای ضد درد مثل آسپرین و بروفن و داروهای ضد فشار خون مثل آتسنول و پروپر انول (ایندرال) که باعث بروز حمله‌ی آسم می شوند خودداری کرده و در صورت نیاز به چنین داروهایی به پزشک خود کرده و ایشان را از وجود زمینه‌ی آسم در خود مطلع کنید تا داروهای دیگری برای شما تجویز شود.

8- اسپری های خود را در زمان مشخص و به روش صحیح استفاده کنید، استفاده ای منظم و دائم آنها حتی در زمان های بدون علامت از بروز علائم و حمله‌ی جلوگیری می کند.

9- اسپری هایی به رنگ آبی (سالبیوتامول) و سبز (آتروونت) معمولاً اثر فوری دارند و برای درمان سریع علائم به کار می روند اما اثر آن ها کوتاه و موقت است، بنابراین باید همواره و در هر شرایطی یکی از آنها (ترجیحاً اسپری آبی) را همراه خود داشته باشید تا در صورت بروز هر یک از علائم (مل تنگی نفس یا سرفه) بتوانید سریعاً از آن استفاده کنید.